


**Definitie groeirestrictie:**

**Eerder kind geboortegewicht < P10 (Hoftiezer curve)**



Bronnen:  
Iris consensus  
NVOG richtlijn  
KNOV-GROW richtlijn  
Richtlijnen herzien VIL onderwerpen

## VSV Samen protocol dysmaturiteit in anamnese (i.a).

1. Intake gesprek en counseling acetylsalicylzuur (ASA) in 2e lijn bij alle cliënten met dysmatuur i.a. (<p10); zo vroeg mogelijk, in ieder geval < 16 weken. Optimale werking ASA bij start 12 weken. Patiënte mag ook al < 12 weken verwezen worden. Inhoud intakegesprek en counseling:
  - Meest waarschijnlijke oorzaak dysmaturiteit achterhalen met info vorige zwangerschap/kind
  - Risicofratificatie, met goede verslaglegging van de counseling en de keuze die de client maakt
  - Informatie over dit protocol
  - Indien gewenst wordt recept ASA 1dd 160mg meegegeven
  - a) Dysmatuur <p3 ia controle in 2e lijn.
  - b) Dysmatuur p3- p5 ia volgens VIL controle 2<sup>e</sup> lijn. Cliënten dienen hiervan op de hoogte te zijn. Hebben keuze voor controle in 1e of 2e lijn.
  - c) Dysmatuur p5-p10 controle in 1<sup>e</sup> lijn.
2. SEO wordt verricht in het Verloskundige Centrum Nijmegen (VCN). Of indien cliënte kiest voor 2<sup>e</sup> lijn controles in 2<sup>e</sup> lijn.
  - ➔ Indien bij SEO FAC en/of EFW <P5, verwijzing binnen 1 week voor consult 2e lijn (voor biometrie en dopplers).
3. Bij bevestiging afbuigende groei: overname 2e lijn en wekelijks dopplers en 1x per 2 weken biometrie

## Verantwoordelijkheid voor optimale dossier voering

Zwangere vrouwen volledig in 1e lijn : 1e lijn. En zwangere vrouwen volledig in 2e lijn: 2e lijn. Voor zwangere vrouwen met een 2e lijns indicatie die hebben gekozen voor de optie shared care zoals bij b) geldt het volgende:

### Verantwoordelijkheid 1e lijn:

- Alle zorg, behalve de groeiecho's die in de 2<sup>e</sup> lijn worden verricht inclusief het plotten van deze groeiecho's.
- Uitslagen intakelab, NIPT, SEO, OGTT, foetale RhD of IRAS Rhc bepaling, Hb, direct met verwijzing meesturen en anders zo spoedig mogelijk doorsturen naar 2e lijn.

### Verantwoordelijkheid 2e lijn:

- Intake en counselinggesprek.
- Het uitvoeren en plotten van groeiecho's met zo nodig dopplers en eventueel vaststellen afbuiging groei en inplannen vervolgspraken.
- De brief met uitslag echo inclusief metingen naar 1e lijn binnen een week (zelfde dag niet nodig omdat vaststellen afbuiging en vervolgspraken gelijk in 2e lijn geregeld worden) versturen.
- Bij de laatste echo rond 36 weken: afsluitend gesprek met vaststellen of patiënte in 1e of 2e lijn gaat bevallen, bij normale groei en afhankelijk van wens patiënte.